

アリナミン®R

【効能】 ●体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善 ●疲労の回復・予防 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩、首、腰または膝の不調、筋力の低下、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ、目の疲れ ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給

金属
：キャップ
ガラス：瓶

80mL



【成分】
1ビン(80mL)中
フルスルチアミン塩酸塩
(ビタミンB1誘導体)
..... 5mg
リボフラビン... 2mg
ピリドキシン塩酸塩
..... 10mg
L-バリン..... 80mg
L-ロイシン... 160mg
L-イソロイシン
..... 80mg
カルニチン塩化物
..... 50mg

添加物：還元麦芽糖
水アメ、スクラロース、
ステビア抽出精製物、
クエン酸水和物、酒石
酸、DL-リンゴ酸、安息
香酸Na、パラベン、
香料、エタノール、プロ
ピレングリコール、バ
ニリン、pH調整剤

★本剤の服用により尿
が黄色くなることが
ありますが、リボフ
ラビンによるもので
心配ありません



体力の維持・改善に

アリナミン®R

フルスルチアミン+BCAA
(バリン・ロイシン・イソロイシン)配合

ノンカフェイン

製造販売元
武田コンシューマヘルスケア株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

香りさわやか

服用に際して、ビンの表示を必ず
読むこと

【使用上の注意】 **相談すること**

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この
ビンを持って医師または薬剤師に相
談すること
- 1.服用後、次の症状があらわれた場合
皮膚：発疹、消化器：胃部不快感
- 2.しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合
- 次の症状があらわれることがあるの
で、このような症状の継続または増強
が見られた場合には、服用を中止し、医
師または薬剤師に相談すること 下痢

【保管および取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保
管すること ●小児の手のとどかない所
に保管すること ●使用期限を過ぎた製
品は服用しないこと

【用法・用量】 15歳以上は1日1回
1ビン(80mL)を服用してください

- 用法・用量を守ること(他のビタミン等
を含有する製品を同時に使用する場
合には過剰摂取等に注意すること)

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-567-087
9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

指定医薬部外品

使用期限

製造番号

24kcal/本

F17EC D6