

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに……

# アネトン<sup>®</sup> せき止め液

〈鎮咳去痰薬〉  
第②類医薬品



91153

アネトンせき止め液は、いろいろな原因で起こる“せき”をしずめ“たん”の切れをよくします。  
また、さわやかなレモンティー風味の液剤です。



## 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)12歳未満の小児。\*
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください（倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。）



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**【効能・効果】**

せき、たん

**【用法・用量】**

年齢により次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数	症状により約 4 時間の間隔をおいて 1 日 6 回まで服用することができます。
成 人 (15 歳以上)	10mL	3 回	
12 歳以上 15 歳未満	6.5mL		
12 歳未満	服用しないでください。		

**【用法・用量に関連する注意】**

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分・分量】**

アネトンせき止め液は淡褐色澄明の液剤で、成人 1 日量(60mL)中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成 分	分 量	は た ら き
コデインリン酸塩水和物	50mg	せきを起す中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。
無水カフェイン	60mg	頭痛、不快感をやわらげ、またねむけをおさえます。
セネガ流エキス	1500mg	気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうすくし、出しやすくします。


添加物として、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、メチルパラベン、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、カラメル、香料、エタノール、pH調節剤を含有します。

**【成分・分量に関連する注意】**



本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

**【包装】**

アネトンせき止め液：100mL

**＜1回の服用量＞**

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-834-389

9:00~17:00(土日祝除く)

製造販売元

**ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社**

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2