



OTC *G U I D E*

【追補版】

アリナミン製薬OTC製品ガイド
2025 *G U I D E*

アリナミン製薬OTC製品ガイド

2025【追補版】

カテゴリー一覧【追補版】

リスク区分 お問い合わせ先

●かぜ薬

ベンザブロックSプレミアムDX ベンザブロックSプレミアムDX錠 【指定第二类医薬品】(アリナミン)
ベンザブロックLプレミアムDX ベンザブロックLプレミアムDX錠 【指定第二类医薬品】(アリナミン)
ベンザブロックIPプレミアムDX ベンザブロックIPプレミアムDX錠 【指定第二类医薬品】(アリナミン)
ベンザブロックTプレミアムDX ベンザブロックTプレミアムDX錠 【指定第二类医薬品】(アリナミン)

●胃腸薬

タケプロンs【要指導医薬品】(アリナミン)

●ビタミン剤

アリナミンナイトリカバーi (アリナミンi) (指定医薬部外品) (アリナミン)
アリナミンナイトリカバーh (アリナミンh) (指定医薬部外品) (アリナミン)

【注】会社名を略記しておりますが、正式名称および製品内容のお問い合わせ先は次の通りです。

アリナミン：アリナミン製薬株式会社 [医薬品・指定医薬部外品] ☎ フリーダイヤル 0120-567-087

鼻水・鼻づまりに のどの痛み・くしゃみに

お得意様用

第2類医薬品
ベンザブロックSプレミアムDX

◎適用年齢／15歳以上 ◎包装／12・24カブレット（錠）

第2類医薬品
ベンザブロックSプレミアムDX錠

◎適用年齢／15歳以上 ◎包装／30・45錠



特徴

- d-クロルフェニラミンマレイン酸塩が、抗ヒスタミン作用により、鼻水・鼻づまり・くしゃみをおさえます。
- プソイドエフェドリン塩酸塩が、鼻粘膜の充血・はれをおさえ、鼻づまりを改善します。
- ベラドンナ総アルカロイドが、鼻腺への刺激の伝達を遮断し、鼻水をおさえます。
- 9種の成分を配合し、かぜのいろいろな症状を緩和します。
- のみやすい小型の淡黄色の錠剤です。

効能

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、のどの痛み、くしゃみ、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1 回量		1日服用回数
	ベンザブロックSプレミアムDX	ベンザブロックSプレミアムDX錠	
15歳以上	2錠(カブレット)	3 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと		

品質
保証期間

3年

☆一度【内袋(アルミの袋)を】*
開封した後は、品質保持の点から
開封日より6か月以内を目安に
なるべくすみやかに服用すること。
※ベンザブロックSプレミアム
DXのみ

成分

ベンザブロックSプレミアムDX 6錠中／ベンザブロックSプレミアムDX錠 9錠中(1日服用量中)

はたらき	成分	含量
熱をさげ、痛みを和らげる	アセトアミノフェン	900mg
鼻水・くしゃみを和らげる	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg
鼻づまりを和らげる	プソイドエフェドリン塩酸塩	135mg
鼻水を和らげる	ベラドンナ総アルカロイド	0.3mg
せきを和らげる	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg
たんを排出しやすくする	ブロムヘキシン塩酸塩	12mg
のどの痛みを和らげる	トラネキサム酸	420mg
頭痛を和らげる	無水カフェイン	75mg
ビタミン	リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg

添加物：セルロース、トウモロコシデンプン、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、三酸化鉄


☆本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンによるものなので心配ありません。

これらの医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いいただきますよう、また、アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談いただきますよう、ご説明ください。
「使用上の注意」は健康サイト(<https://alinamin-kenko.jp>)からご覧いただけます。

鼻から始まる

つらいかぜ症状を追求した処方 9種類の成分

鼻に効く成分を3種類配合。
つらい鼻水・鼻づまり両方に優れた効果を発揮します。



販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	ベンザブロックSプレミアムDX		ベンザブロックSプレミアムDX錠	
包 装	[PTP品]12カブレット(錠)	[PTP品]24カブレット(錠)	30錠	45錠
メーカー希望小売価格	1,537円(税抜価格1,398円)	2,197円(税抜価格1,998円)	1,757円(税抜価格1,598円)	2,197円(税抜価格1,998円)
バーコード				

製造販売元



アリナミン製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

●ベンザブロック ブランドサイト
●健康サイト

<https://benza.jp>
<https://alinamin-kenko.jp>

のどの痛み・せきに 鼻づまり・熱に

第2類医薬品

ベンザブロックLプレミアムDX

◎適年齢／15歳以上 ◎包装／12・24カブレット(錠)



第2類医薬品

ベンザブロックLプレミアムDX錠

◎適年齢／15歳以上 ◎包装／30・45錠



特徴

- **イブプロフェン**を600mg(1日量)配合し、**のどの痛み**をおさえ、**熱**を下げます。
- **トラネキサム酸**が粘膜の炎症をおさえ、**のどの痛み**をしずめます。
- **デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物**が、せき中枢にはたらき、**せき**をしずめます。
- 8種の成分を配合し、かぜのいろいろな症状を緩和します。
- のみやすい小型の白色～帯黄白色の錠剤です。

効能

かぜの諸症状(のどの痛み、せき、発熱、鼻づまり、鼻水、くしゃみ、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、
かまずに服用すること。

年 齢	1 回量		1日服用回数
	ベンザブロックLプレミアムDX	ベンザブロックLプレミアムDX錠	
15歳以上	2錠(カブレット)	3 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと		

品質
保証期間

3年

☆一度[内袋(アルミの袋)]を*
開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安
になるべくすみやかに服用すること。
※ベンザブロックLプレミアムDXのみ

成分

ベンザブロックLプレミアムDX 6錠中／ベンザブロックLプレミアムDX錠 9錠中(1日服用量中)

はたらき	成分	含量
熱をさげ、痛みを和らげる	イブプロフェン	600mg
のどの痛みを和らげる	トラネキサム酸	750mg
せきを和らげる	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	48mg
たんを排出しやすくする	ブロムヘキシン塩酸塩	12mg
たんを排出しやすくする	グアイフェネシン	250mg
鼻づまりを和らげる	ブソイドエフェドリン塩酸塩	135mg
鼻水・くしゃみを和らげる	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg
頭痛を和らげる	無水カフェイン	75mg

添加物：トウモロコシデンプン、セルロース、還元麦芽糖水アメ、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン


これらの医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いいただきますよう、また、アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談いただきますよう、ご説明ください。
「使用上の注意」は健康サイト(<https://alinamin-kenko.jp>)からご覧いただけます。

のどから始まる
つらいかぜ症状を追求した処方

8種類の成分

のどの痛み[※]に効く成分2種類を最大量配合[※]。
のどの不快感の原因となる諸症状に優れた効果を発揮します。

※イブプロフェン、トラネキサム酸「かぜ薬ベンザ1日量として」



ベンザブロックLプレミアムDX 6錠中／ベンザブロックLプレミアムDX錠 9錠中(15歳以上の1日服用量中)

イメージ図

販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	ベンザブロックLプレミアムDX		ベンザブロックLプレミアムDX錠	
包 装	[PTP品]12カブレット(錠)	[PTP品]24カブレット(錠)	30錠	45錠
メーカー希望小売価格	1,537円(税抜価格1,398円)	2,197円(税抜価格1,998円)	1,757円(税抜価格1,598円)	2,197円(税抜価格1,998円)
バーコード				

製造販売元 アリナミン製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

●ベンザブロック ブランドサイト <https://benza.jp>
●健康サイト <https://alinamin-kenko.jp>

熱ねつ

セルフメディケーション
税 控除 対象

熱ねつっぽさ・さむけ・頭痛にのどの痛み・関節の痛み

第2類医薬品

ベンザブロックIPプレミアムDX

◎適用年齢／15歳以上 ◎包装／12・24カブレット（錠）



第2類医薬品

ベンザブロックIPプレミアムDX錠

◎適用年齢／15歳以上 ◎包装／30・45錠



特徴

- **イブプロフェンとアセトアミノフェン**の2種の解熱鎮痛成分がはたらき、**のどの痛み**をおさえ、**熱**を下げます。
- **チアミン硝化物**が、**かぜ**によって消耗した体力の回復を促します。
- **アスコルビン酸カルシウム**が、**かぜ**の時に消耗しやすい**ビタミンC**を補給します。
- 9種の成分を配合し、かぜのいろいろな症状を緩和します。
- のみやすい小型の淡黄褐色の錠剤です。

効能

かぜの諸症状（発熱、悪寒（発熱によるさむけ）、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、鼻水、鼻づまり、筋肉の痛み、せき、たん、くしゃみ）の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1 回量		1日服用回数
	ベンザブロックIPプレミアムDX	ベンザブロックIPプレミアムDX錠	
15歳以上	2錠（カブレット）	3 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと		

品質保証期間

3年

☆一度【内袋（アルミの袋）を】＊開封した後は、品質保持の点から開封日より6か月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。
※ベンザブロックIPプレミアムDXのみ

成分

ベンザブロックIPプレミアムDX 6錠中／ベンザブロックIPプレミアムDX錠 9錠中（1日服用量中）

はたらき	成分	含量
発熱やさむけを緩和し、痛みを和らげる	アセトアミノフェン	180mg
	イブプロフェン	360mg
鼻水・くしゃみを和らげる	メキタジン	4mg
せきを和らげる	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg
せき・たんを和らげる	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
のどの炎症をおさえて、痛みを和らげる	グリチルリチン酸	39mg
頭痛を和らげる	無水カフェイン	75mg
ビタミン	チアミン硝化物	25mg
ビタミン	アスコルビン酸カルシウム	500mg

添加物：トウモロコシデンプン、還元麦芽糖水アメ、酒石酸、セルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、エリスリトール、ポリビニルアルコール（部分けん化）、タルク、酸化チタン、三酸化鉄

これらの医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いいただきますよう、また、アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談いただきますよう、ご説明ください。
「使用上の注意」は健康サイト（<https://alinamin-kenko.jp>）からご覧いただけます。


お得意様用

熱ねつっぽさから始まる

つらいかぜ症状を追求した処方

9種類の成分

発熱、さむけを緩和する成分を2種類配合。さらに発熱時消耗しやすいビタミンを配合し、つらい発熱などの症状に優れた効果を発揮します。



ベンザブロックIPプレミアムDX 6錠中／ベンザブロックIPプレミアムDX錠 9錠中（15歳以上の1日服用量中）

イメージ図

販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	ベンザブロックIPプレミアムDX	ベンザブロックIPプレミアムDX錠
包 装	[PTP品]12カブレット（錠）	[PTP品]24カブレット（錠）
メーカー希望小売価格	1,537円（税抜価格1,398円）	2,197円（税抜価格1,998円）
バーコード	4 987910 003405	4 987910 003412

製造販売元



アリナミン製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

●ベンザブロック ブランドサイト
●健康サイト

<https://benza.jp>
<https://alinamin-kenko.jp>

せき

せき・たんに のどの痛み・鼻水に

セルフメディケーション
税 控 除 対 象

お得意様用

第2類医薬品

ベンザブロックTプレミアムDX

第2類医薬品

ベンザブロックTプレミアムDX錠

◎適用年齢／15歳以上 ◎包装／12・24カブレット（錠） ◎適用年齢／15歳以上 ◎包装／30・45錠



- 特徴**
- **イブプロフェン**を600mg（1日量）配合し、**のどの痛み**をおさえ、**熱**を下げます。
 - **ジヒドロコデインリン酸塩**が、せき中枢にはたらき、**せき**をしずめます。
 - **dl-メチルエフェドリン塩酸塩**が、気管支をひろげ、呼吸を楽にして**せき**をしずめたり、**たん**を排出しやすくします。
 - **アンブロキシール塩酸塩**が、気道粘膜で異物を排出する動きを高め、**たん**を排出しやすくします。
 - 8種の成分を配合し、かぜのいろいろな症状を緩和します。
 - のみやすい小型の淡黄色の錠剤です。

効能 かぜの諸症状(せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1 回量		1日服用回数
	ベンザブロックTプレミアムDX	ベンザブロックTプレミアムDX錠	
15歳以上	2錠(カブレット)	3 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと		

品質保証期間 3年

☆一度【内袋(アルミの袋)を】*開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。
※ベンザブロックTプレミアムDXのみ

成分 ベンザブロックTプレミアムDX 6錠中／ベンザブロックTプレミアムDX錠 9錠中（1日服用量中）


はたらき	成分	含量
熱をさげ、痛みを和らげる	イブプロフェン	600mg
せきを和らげる	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
せき・たんとを和らげる	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
たんを和らげる	アンブロキシール塩酸塩	45mg
鼻水・くしゃみを和らげる	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg
頭痛を和らげる	無水カフェイン	75mg
ビタミン	リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg
ビタミン	チアミン硝化物	25mg

添加物：乳糖水和物、セルロース、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、還元麦芽糖水アメ、エリスリトール、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、タルク、酸化チタン、三酸化鉄

☆本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンによるものなので心配ありません。

せきから始まる
つらいかぜ症状を追求した処方 8種類の成分

せき・たんをおさえる成分を3種類配合。
つらいせき症状に優れた効果を発揮します。



販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	ベンザブロックTプレミアムDX		ベンザブロックTプレミアムDX錠	
	包装			
包 装	[PTP品]12カブレット(錠)	[PTP品]24カブレット(錠)	30錠	45錠
メーカー希望小売価格	1,537円(税抜価格1,398円)	2,197円(税抜価格1,998円)	1,757円(税抜価格1,598円)	2,197円(税抜価格1,998円)
バーコード				

医療用と同じ成分を市販薬で初めて配合

(ランソプラゾール)

タケプロン[®]S

要指導医薬品

胃酸逆流
などによる

胸やけ

胃もたれ

胃の痛み

の胃の不調に

1日1回1錠

水なしでのめる
口腔内崩壊錠



厚さ 4.6mm

直径 8.5mm

重さ1錠：0.285g

白色～帯黄白色の素錠で
赤橙色～暗褐色の斑点がある
(腸溶性細粒を含む口腔内崩壊錠)

特徴

- 胃酸逆流などによる胸やけ、胃もたれ、胃の痛みに
- 医療用と同じ成分、ランソプラゾールを市販薬で初めて配合
- 1日1錠で、24時間効果が持続
- 水なしでのめる口腔内崩壊錠
- すみやかに腸へ届いて吸収され、効果を発揮
- 食事の影響を受けにくく、いつでものめる*

* 1日1回1錠を毎日同じ時間帯に服用してください。

効能

胸やけ、もたれ、胃痛（本剤は胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬を含んでいます）

用法・用量

次の量を、口中で崩壊させて服用するか、水またはお湯で服用すること。

年 齢	1 回量	1日服用回数
15歳以上	1 錠	1 回
15歳未満	服用しないこと	

☆2週間を超えて続けて服用しないこと。
●1日1回同じ時間帯に服用すること。 ●症状が治まった場合は、服用を止めること。
●本剤は口腔内で崩壊するが、口腔の粘膜から吸収されることはないため、唾液または水でのみこむこと。

品質保証期間

3年

成分

1錠(1日服用量)中

成 分	含 量
ランソプラゾール	15mg

添加物：乳糖水和物、セルロース、炭酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、D-マンニトール、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート80、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、クエン酸トリエチル、マクロゴール、ステアリン酸グリセリン、三二酸化鉄、クエン酸、クロスポビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、香料

- 本剤は要指導医薬品です。販売の際は必ずチェックシートで薬剤師がお客様に服用いただけるかを確認してください。「チェックシート」は、タケプロンSブランドサイト(<https://takepron-s.jp>)からダウンロード・印刷が可能です。
- 他のプロトンポンプ阻害薬の使用期間も合わせて2週間を超えて続けて服用しないでください。2週間服用しても症状が残る場合、重大な消化器疾患を見過ごすおそれがありますので、医師の診察を受けてください。
- 3日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

この医薬品は、薬剤師から説明を受けて、「使用上の注意」をよく読んで、正しくお使いいただきますよう、ご説明ください。「使用上の注意」は健康サイト(<https://alinamin-kenko.jp>)からご覧いただけます。

医療用と同じ成分ランソプラゾールが「プロトンポンプ」を阻害し胃酸分泌を強力に抑えます。

タケプロン[®]Sの特徴 1 胃酸分泌の最終段階であるプロトンポンプを阻害



胃酸は3つの神経伝達物質の関与により、プロトンポンプが作用することで分泌されます。タケプロンSはこれらいずれの物質の関与があっても胃酸分泌の最終段階であるプロトンポンプを阻害するので、胃酸分泌を強力に抑えることができます。


タケプロン[®]Sの特徴 2 水なしでのめる口腔内崩壊錠



胸やけ、胃もたれ、胃の痛みがつらいと感じた時に、いつでも*、どこでもおのみいただけます。

* 1日1回1錠を毎日同じ時間帯に服用してください。

タケプロン[®]Sの特徴 3 ランソプラゾールを直径約0.3mmの7層コーティング細粒として錠剤に配合



タケプロンSは、独自の製剤技術を用いたマルチプルユニットタイプ。腸溶性細粒を7層構造とすることで製剤の安定性を向上させるとともに、のんだ時の苦みをマスキングしました。


1錠あたり、約5000粒のコーティング細粒を配合しています。

タケプロンSの腸溶性細粒は胃から腸に移行し、腸から吸収されたのち胃の壁細胞に届き効果を示します。

固形物の直径が2mmより大きい小さいかで胃から腸への移行の仕方が異なります。

タケプロンS

タケプロンSの腸溶性細粒の直径は約0.3mmのため胃の動きにかかわらず速やかに胃から腸に移行します。



2mmを超える固形物
2mmを超える固形物は空腹時強収縮が起きるまで胃の中に滞留します。

さらに、水なしでのんだ時のざらつき感をなくすため、この2mmよりもさらに小さい直径約0.3mmにしています。

販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	タケプロンS
包 装	14錠
メーカー希望小売価格	2,508円(税抜価格2,280円)
バーコード	

朝が変わる! 疲れ目に休息を。

アリナミン

NIGHT RECOVER*i*

指定医薬部外品

夜飲用に適した...

ノンカフェイン

飲みやすい風味

低カロリー

目の疲れ

50mL

50mL×3

50mL×10

黄色の澄明な液

特徴

1

寝る前に飲むと、寝ている間に有効成分が身体に浸透。疲労を軽減し、朝、気持ちよくスタートできます。

2

抗疲労成分フルスルチアミン、目に関与する生薬クコシ、睡眠に関与するアミノ酸グリシンなどを配合し、栄養不良に伴う目の疲れ、睡眠の質(寝付きの悪さ・眠りの浅さ・目覚めの悪さ)を改善。

3

全8種類の有効成分を配合し、疲れに優れた効果を発揮。

4

睡眠を妨げるカフェインが入っていません。

効能

●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：目の疲れ、寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、肩、首、腰または膝の不調、冷えやすい、血行が悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)

●疲労の回復・予防

●体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善

●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給

用法・用量

●15歳以上は1日1回1ビン(50mL)を服用してください

●用法・用量を守ること
(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

品質保証期間

3年

成分

1ビン(50mL)中

成分	含量
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₁ 誘導体)	1.1mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB ₂ リン酸エステル)	15mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg
d-α-トコフェロール酢酸エステル(酢酸d-α-トコフェロール)	5mg
ニコチン酸アミド	60mg
グリシン	50mg
タウリン(アミノエチルスルホン酸)	200mg
クコシ流エキス	0.3mL (クコシ300mgより抽出)

添加物：中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、モノステアリン酸デカグリセリル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、DL-リンゴ酸、アセスルファムカリウム、スクラロース、エリスリトール、香料、プロピレングリコール、パニリン、エタノール、トメントール、pH調整剤

★本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウムによるもので心配ありません

★生薬エキスを配合していますので、まれに沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません

使用上の注意

■相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このピンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このピンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 下痢

3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、このピンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

保管および取扱い上の注意

●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること

●小児の手のとどかない所に保管すること

●使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名・包装・バーコード

販売名	アリナミン <i>i</i>		
包装	50mL	50mL×3	50mL×10
バーコード			

朝が変わる! 冷えが変わる。

アリナミン

NIGHT RECOVER*h*

指定医薬部外品

夜飲用に適した...

ノンカフェイン

飲みやすい風味

低カロリー

冷え

50mL

50mL×3

50mL×10

黄色の澄明な液

特徴

1

寝る前に飲むと、寝ている間に有効成分が身体に浸透。疲労を軽減し、朝、気持ちよくスタートできます。

2

冷えや血行の悪さに関与する3種の生薬トウキ、シャクヤク、ショウキョウとビタミンEを配合。

3

抗疲労成分フルスルチアミン、冷えに関与する生薬とビタミンE、睡眠に関与するアミノ酸グリシンなどを配合し、栄養不良に伴う冷えやすさや血行の悪さ、睡眠の質(寝付きの悪さ・眠りの浅さ・目覚めの悪さ)を改善。

4

全8種類の有効成分を配合し、疲れに優れた効果を発揮。

5

睡眠を妨げるカフェインが入っていません。

効能

●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：冷えやすい、血行が悪い、寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い、肩、首、腰または膝の不調、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、目の疲れ

●疲労の回復・予防

●体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善

●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給

用法・用量

●15歳以上は1日1回1ビン(50mL)を服用してください

●用法・用量を守ること
(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

品質保証期間

3年

成分

1ビン(50mL)中

成分	含量
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₁ 誘導体)	1.1mg
グリシン	50mg
シャクヤクエキス	22.5mg (シャクヤク90mgより抽出)
ショウキョウ流エキス	0.1mL (ショウキョウ100mgより抽出)
トウキ流エキス	0.3mL (トウキ300mgより抽出)
d-α-トコフェロール酢酸エステル(酢酸d-α-トコフェロール)	5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB ₂ リン酸エステル)	15mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg

添加物：中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、モノステアリン酸デカグリセリル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、DL-リンゴ酸、アセスルファムカリウム、スクラロース、エリスリトール、香料、フェノール類、アルコール(0.13mL以下)、pH調整剤

★本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウムによるもので心配ありません

★生薬エキスを配合していますので、まれに沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません

使用上の注意

■相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このピンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このピンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 下痢

3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、このピンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

保管および取扱い上の注意

●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること

●小児の手のとどかない所に保管すること

●使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名・包装・バーコード

販売名	アリナミン <i>h</i>		
包装	50mL	50mL×3	50mL×10
バーコード			

アリナミン製薬OTC製品ガイド【追補版】

2025 年 9 月 30 日 追補1版発行

編集・発行 **アリナミン製薬株式会社**

〒100-0005

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

S e l f - M e d i c a t i o n



アリナミン製薬株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号