

アクトエージAN錠

【使用上の注意】

【解説】

共通事項解説はこちら

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

<用法・用量に関する注意>

用法・用量を厳守すること。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

- (2)小児の手の届かない所に保管すること。

- (3)他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。

- (4)ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすること（詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるもとなる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである）。

- (5)服用のつどビンのフタをしっかりとしめること（吸湿し品質が変わる）。

- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

- (7)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。

- (8)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。

共通事項解説〔5〕参照

本剤の服用により、人によってはこれらの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合には服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

これらの症状は、服用を一時中止すれば消失するのですが、症状の持続または増強が見られた場合には、他に原因があることも考えられるので、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は、他に原因があることも考えられます。症状がよくならないまま服用を続けると悪化することも考えられるため、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

共通事項解説〔7〕参照

共通事項解説〔9〕参照

共通事項解説〔10〕参照

共通事項解説〔11〕参照

共通事項解説〔12〕参照

共通事項解説〔13〕参照

共通事項解説〔14〕参照

共通事項解説〔15〕参照

共通事項解説〔16〕〈参照