

アリナミンRオフ、アリナミン7、アリナミンゼロ7、アリナミンV、アリナミンVゼロ、アリナミンV&V NEW、アリナミンV&Vロイヤル、アリナミンナイトリカバー、アリナミンメディカルバランス、アリナミンメディカルバランスN、アリナミンメディカルバランスS、アリナミンメディカルバランスT

【使用上の注意】

【解 説】

共通事項解説はこちら

△使用上の注意



相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このビン（袋）を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	胃部不快感

- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このビン（袋）を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

下痢

- 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このビン（袋）を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守ること（他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること）

<成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン（リボフラビンリン酸エステルナトリウム）によるもので心配ありません

保管および取扱い上の注意

アリナミンメディカルバランス、アリナミンメディカルバランスN、アリナミンメディカルバランスS、アリナミンメディカルバランスT

- ・凍結させないこと

アリナミンRオフ、アリナミン7、アリナミンゼロ7、アリナミンV、アリナミンVゼロ、アリナミンV&V NEW、アリナミンV&Vロイヤル、アリナミンナイトリカバー、アリナミンメディカルバランス、アリナミンメディカルバランスN、アリナミンメディカルバランスS、アリナミンメディカルバランスT

- ・直射日光の当たらない涼しい所に保管すること

- ・小児の手のとどかない所に保管すること

- ・使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

本剤の服用により、人によってはこれらの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合には服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

この症状は、服用を一時中止すれば消失するものですが、症状の持続または増強が見られた場合には、他に原因があることも考えられるので、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

しばらく（3ヵ月ぐらい）服用しても症状がよくなるのには、そのまま服用を続けることは好ましくありません。また、症状がよくなる場合は、他に原因があることも考えていただくための注意です。

共通事項解説〔7〕参照

体内に吸収されたりボフラビン（ビタミンB₂）およびリボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂リン酸エステル）は、一部がビタミンB₂として尿中に排泄されます。ビタミンB₂は黄色の蛍光を発するため、尿が黄色くなります。

本剤を凍らせてしまうと品質に影響を及ぼすおそれがあります。また、凍らせることで容器の破損・破裂を引き起こす可能性があるための注意です。

共通事項解説〔9〕参照

共通事項解説〔10〕参照

共通事項解説〔14〕参照