アリナミジナイトリカバー錠

ビタミン含有保健剤

販売名:アリナミンs

指定医薬部外品

特徴

●アリナミンナイトリカバー錠は、吸収にすぐれた ビタミンB₁誘導体フルスルチアミン、睡眠に関与する グリシン、疲労回復に関与するエゾウコギを配合。 睡眠・休息時の疲労回復、栄養不良に伴う睡眠の質 (眠りの浅さ、目覚めの悪さ)の改善にすぐれた効果 をあらわします。



- ●三大栄養素(糖質、脂質、タンパク質)を効率よく エネルギーに変える助けをするフルスルチアミン、ビタミンB₂、 ビタミンB₆、ニコチン酸アミドを配合しています。
- ●カフェインを含んでいないので、就寝前でも気にせず服用いただけます。
- ●黄色の糖衣錠でのみやすく、1回1~2錠、1日1回で効果があります。

- / 使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師 または登録販売者に相談すること

関係部位	症
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

- 2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること軟便、下痢
- 3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

- ●疲労の回復・予防
- ●体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善
- ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防: 寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い、疲れやすい、疲れが残る、 体力がない、身体が重い、身体がだるい、肩、首、腰または膝の不調、 二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ、目の疲れ、肌の不調(肌荒れ、 肌の乾燥)、骨または歯の衰え
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠 授乳期または産前産後等の栄養補給

用法・用量)

次の量を、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1~2錠	1 🗇
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守ること(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用 する場合には過剰摂取等に注意すること)。

成 分 2錠(1日最大服用量)中

成 分	含量
フルスルチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体)として	10mg
(フルスルチアミン塩酸塩	10.916mg)
リボフラビン(ビタミンB₂)	8mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	8mg
ニコチン酸アミド	24mg
グリシン	50mg
	16mg
(エゾウコギとして	400mg)

添加物:トウモロコシデンプン、乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、 ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、 エリスリトール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、 ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、メチルセルロース

<成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンに よるものなので心配ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓 して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり 品質が変わる)。
- (4)ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること (詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が 変わるもとになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止する ためのものである)。
- (5)服用のつどビンのフタをしっかりしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入する こと。
- (8)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安 になるべくすみやかに服用すること。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。 アリナミン製薬株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087 受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

なお、健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

健康サイト

https://alinamin-kenko.jp



アリナミン製薬株式会社 製造販売元

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号