

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アネトンせき止め液
2	成分・分量	60mL(成人1日量)中 コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン) 50mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg、無水カフェイン 60mg、セネガ流エキス 1500mg
3	用法・用量	成人(15歳以上)1回10mL、12歳以上15歳未満1回6.5mLを、1日3回、症状により約4時間の間隔を置いて1日6回まで服用することができる。
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none">次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 12歳未満の小児本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください過量服用・長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。