

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アリナミン A
2	成分・分量	3錠(15歳以上の1日最大服用量)中 フルスルチアミン(ビタミン B ₁ 誘導体)として 100mg (フルスルチアミン塩酸塩 109.16mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B ₆) 20mg、 シアノコバラミン(ビタミン B ₁₂) 60 μg、リボフラビン(ビタミン B ₂) 12mg、 パントテン酸カルシウム 15mg
3	用法・用量	15歳以上 1回 1~3錠、11歳~14歳 1回 1~2錠、7歳~10歳 1回 1錠を 1日 1回、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用
4	効能・効果	1. 次の場合のビタミン B ₁ の補給 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 2. 次の諸症状の緩和 筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 3. 脚気 「ただし、上記 2 および 3 の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2014. 6】