

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ベンザブロック S
2	成分・分量	6錠(15歳以上の1日服用量)中 アセトアミノフェン 900mg、 ヨウ化イソプロパミド 6mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、 トラネキサム酸 420mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、ヘスペリジン 90mg
3	用法・用量	15歳以上1回2錠、12歳～14歳1回1錠を1日3回、食後なるべく30分以内に、 水またはお湯で、かまずに服用
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、のどの痛み、くしゃみ、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、 関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないで下さい <ol style="list-style-type: none"> 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 12歳未満の小児 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬 等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)、トラネキサム酸 を含有する内服薬、胃腸鎮痛鎮痙薬 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 服用前後は飲酒しないで下さい 長期連用しないで下さい <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師または歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、 胃・十二指腸潰瘍、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、 血栓症を起こすおそれのある人、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、 肥満症 ・副交感神経遮断剤(ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキス 等)を含有する内服薬を服用している人 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。