

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ベンザブロックせき止め液 1回量のみ切りタイプ
2	成分・分量	1本(10mL、1回量)中 ジヒドロコデインリン酸塩 5mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 12.5mg、グアイフェネシン 50mg、 セネガ流エキス 0.1mL(セネガ 100mgより抽出)、トラネキサム酸 70mg
3	用法・用量	15歳以上 1回1本(10mL)、1日3回、必要な場合には1日4回まで服用することができる。ただし、服用間隔は4時間以上あけること。
4	効能・効果	のどの痛みを伴う せき・たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないで下さい 15歳未満の小児 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)、トラネキサム酸を含有する内服薬 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 過量服用・長期連用しないで下さい <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師または歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱 ・次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、甲状腺機能障害、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2019. 7】