

のどの痛みを伴うせき・たんに

症状を早めに抑える液剤

第2類医薬品

ベンザブロック[®]せき止め液 1回量のみ切りタイプ

◎適年齢/15歳以上 ◎包装/10mL

便利な1回量
のみ切りタイプ



スッキリとした
メントール味
褐色澄明な液

- のどの痛みを伴う せき・たんに、よく効く鎮咳去痰薬です。
- せき中枢に作用するジヒドロコデインリン酸塩、グアイフェネシンなどの鎮咳去たん成分に加えて、**痛み・ハレを抑えるトラネキサム酸**を配合。**のどの痛みを伴うせき・たん**によく効きます。
- スッキリとした**メントール(添加物:清涼化剤)**味で、甘さを抑えたサラッとしたのみごちの液剤です。
- 1回量をのみ切り包装としているため、忙しいときでも場所を選ばず服用できます。
- 食事のタイミングに制限されずに服用できます。(服用間隔は4時間以上あけてください)

効能

のどの痛みを伴う せき・たん

用法 用量

次の1回量を、1日3回、必要な場合には1日4回まで服用することができる。ただし、服用間隔は4時間以上あけること。

年齢	1回量
15歳以上	1本(10mL)
15歳未満	服用しないこと

品質 保証期間

4年

成分

1日量(4本)中<1本10mL>

はたらき	成分	含量
せきを和らげる	ジヒドロコデインリン酸塩	20mg
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	50mg
たんを排出しやすくする	グアイフェネシン	200mg
	セネガ流エキス	0.4mL (セネガ400mgより抽出)
のどの痛みを和らげる	トラネキサム酸	280mg


添加物：還元麦芽糖水アム、スクラロース、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、l-メントール、パラベン、安息香酸Na、カラメル、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン

この医薬品は、「使用上の注意」をよく読んで正しくご使用いただきますよう、ご説明ください。
「使用上の注意」は健康サイト(<https://alinamin-kenko.jp>)からご覧いただけます。

のどの痛みを伴う せき・たんに効く5種の配合成分

15歳以上の1日最大服用量中

トラネキサム酸
280mg
プラスミンのはたらきを抑えてのどの痛みやハレなどを改善します。
(抗プラスミン作用)



ジヒドロコデインリン酸塩 20mg **せきに**
せき中枢の異常な興奮を抑え、せきを鎮めます。はげしいせきにも優れた効果を発揮します。

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg
交感神経を興奮させて気管支を上げ、気道の通りをよくし、せきを鎮め、たんの出をよくします。

グアイフェネシン 200mg **たんに**
気道の粘液の分泌を高め、粘稠なたんを薄めるとともに、気道壁に付着したたんを離れやすくして、去たん作用を示します。

セネガ流エキス 0.4mL
気道の線毛運動を促進し、気道の粘液分泌を増加させて去たん作用を示します。

(イメージ図)

ベンザブロックせき止め液1回量のみ切りタイプは、このような方におすすめ

- 外出先などでの、のどの痛みを伴うせき・たんを、その場で抑えたい人に。
- 痛いのどをうるおしながら、せき・たんを抑えたい人に。
- 錠剤が苦手な人にも。



販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	ベンザブロックせき止め液1回量のみ切りタイプ
包装	3本入り (10mL×3本)
メーカー希望小売価格	1,045円(税抜価格950円)
バーコード	 4 987123 700283