

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ベンザブロックせき止め錠
2	成分・分量	9錠(15歳以上の1日服用量)中 ジヒドロコデインリン酸塩 30mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg、ノスカピン 60mg、 ブロムヘキシン塩酸塩 12mg、トラネキサム酸 420mg
3	用法・用量	15歳以上1回3錠、12歳～14歳1回2錠を、1日3回、食後なるべく30分以内に、 水またはお湯で、かまずに服用
4	効能・効果	のどの痛みを伴う せき・たん
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 12歳未満の小児</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)、トラネキサム酸を含有する内服薬</p> <p>3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい</p> <p>5. 過量服用・長期連用しないで下さい</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師または歯科医師の治療を受けている人</li> <li>・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>・次の症状のある人 高熱</li> <li>・次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、甲状腺機能障害、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> </ul> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。