

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ベンザブロクトローチ
2	成分・分量	6錠(11歳以上の1日服用量)中 デキストロメトルフアンフェノールフタリン塩 60mg、 グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg、セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg
3	用法・用量	11歳以上 1回1錠、1日6回(服用間隔2時間以上)、8歳～10歳 1回1錠、1日4回(服用間隔4時間以上)、5歳～7歳 1回1錠、1日3回(服用間隔4時間以上)、 口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用
4	効能・効果	せき、たん、 のどの炎症によるのどのはれ・のどの痛み・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい 他の鎮咳去たん薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、 乗り物酔い用薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)、鎮静薬 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱  【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2014. 6】