

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ベンザブロック IP
2	成分・分量	6錠(1日服用量)中 イブプロフェン 450mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、 ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、無水カフェイン 75mg、ヘスペリジン 90mg
3	用法・用量	15歳以上 1回 2錠、1日 3回、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、鼻水、鼻づまり、筋肉の痛み、せき、たん、くしゃみ)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい</p> <p>(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>(3) 15歳未満の小児</p> <p>(4) 出産予定日12週以内の妊婦</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないで下さい</p> <p>6. 5日間を超えて服用しないで下さい</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師または歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 ・次の病気にかかったことのある人 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。