

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	タケダ漢方便秘薬
2	成分・分量	4錠(15歳以上の1日最大服用量)中 大黄甘草湯エキス散(金匱要略、26.7%量) 800mg 〔ダイオウ 1,067mg、カンゾウ 267mgより抽出〕
3	用法・用量	15歳以上軽い便秘(2~3日便通がないとき)には1錠~3錠、頑固な便秘(4日以上便通がないとき)には2錠~4錠、5歳~14歳軽い便秘(2~3日便通がないとき)には半錠~1錠半、頑固な便秘(4日以上便通がないとき)には1錠~2錠を1日1回、就寝前に水またはお湯で、かまずに服用 錠剤には割線が入っているので、便通の具合をみながら、半錠ないし1錠ずつ増量(上記の最大量まで)または減量
4	効能・効果	・便秘 ・便秘に伴う腹部膨満・ふきでもの(にきび)・腸内異常醗酵・痔・頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・食欲不振(食欲減退)などの症状の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい 他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) ・胃腸が弱く下痢しやすい人 ・次の症状のある人 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2014. 6】