

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

# ベンザブロック®のどスプレー

□ 腔 咽 喉 薬

指定医薬部外品

## 特 徴

- セチルピリジニウム塩化物水和物(口腔内殺菌成分)の、のどスプレーなので、シュッとスプレーすることで、のどの炎症による のどの痛み・ハレを抑えます。
- 無色澄明な液で、服や手などが汚れるのを気にせずに、どこでもお使いいただけます。
- キャップ付の容器なので、衛生的で持ち運びにも便利です。
- ほのかなメントール(添加物：矯味剤)味がし、口の中がスッキリとします。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

長期連用しないこと



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
□内のひどいだけ

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、はきけ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

□の刺激感

## 効 能

のどの炎症による のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

(裏面へ続く)

## 用法・用量

1日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布すること。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)口を開けてできるだけ口元に容器を近づけ、のどの患部に噴射口を向けて、軽く息をはきながら、1回3～4噴射・1日3～6回を目安として使用すること。
- (2)噴射の際には、薬液が目に入るのを防ぐために、目を軽く閉じること。  
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること  
(小児(15歳未満)の臨床試験は行われていない)。
- (4)のどの患部への噴射塗布にのみ使用し、内服用としては使用しないこと。
- (5)用法・用量を厳守すること。

### 「使用方法」

1. キャップをはずして、頭部の△と胸部の△の方向が合っていることを確認してください。  
(噴射方向を一定にするため)



2. 口を開けてできるだけ口元に容器を近づけ、グリーン色の噴射口をのどの患部に向けて、軽く息をはきながら頭部(下図参照)を押してください。  
1回3～4噴射・1日3～6回を目安としてご使用ください。



3. 噴射の際には、薬液が目に入るのを防ぐために、目を軽く閉じてください。  
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

初めて使用するときは、人(目)に向けずに、薬液が出るまで7～8回押してください。

## 成分 20mL中

成分	含量
セチルピリジニウム塩化物水和物	60mg

添加物：D-ソルビトール、トメントール、ハッカ油、香料、ポビドン、リン酸二水素Na、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓(容器の首の部分をしっかりしめる)して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

アリナミン製薬株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

なお、健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

健康サイト

検索

<https://alinamin-kenko.jp>



製造販売元 **アリナミン製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号