

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ベンザ鼻炎薬α〈1日2回タイプ〉
2	成分・分量	2錠(1日服用量)中 塩酸プソイドエフェドリン 120mg、 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg、トラネキサム酸 420mg、 ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg、無水カフェイン 100mg
3	用法・用量	15歳以上 1回1錠、1日2回、朝食後および夕食後(または就寝前)に、水またはお湯で、かまずに服用
4	効能・効果	アレルギー性鼻炎または急性鼻炎による次の諸症状の緩和 鼻水、鼻づまり、くしゃみ、なみだ目、のどの痛み、頭痛
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい</p> <p>(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) 次の症状のある人 前立腺肥大による排尿困難</p> <p>(3) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい</p> <p>他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去たん薬、乗り物酔い用薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)、塩酸プソイドエフェドリンまたは硫酸プソイドエフェドリンを含有する内服薬、トラネキサム酸を含有する内服薬、胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>3. 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないで下さい</p> <p>4. 長期連用しないで下さい</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師または歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・授乳中の人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人 緑内障、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人 ・モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人 ・副交感神経遮断剤(ペラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキス等)を含有する内服薬を服用している人 ・かぜ薬、鎮咳去たん薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、ふるえ、動悸を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2014. 6】