

# ビオスリー Hi錠

## ビオスリー H

【使用上の注意】

【解 説】

共通事項解説はこちら

### △使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。  
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、この添付文書（箱）を持って  
医師又は薬剤師にご相談ください。  
1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。
- (2)用法・用量を厳守してください。
- (3)ビオスリー Hi錠 (PTP品)  
錠剤の取り出し方  
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故に繋がります。)



### 保管および取扱い上の注意

- (1)ビオスリー Hi錠 (ビン入り品)  
直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (1)ビオスリー Hi錠 (PTP品)、ビオスリー H  
直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)ビオスリー H  
本製品は添付文書が添付されておりませんので、この箱をお薬とともに保管し、服用に際して必ずお読みください。
- (3)ビオスリー Hi錠 (ビン入り品、PTP品)
- (4)ビオスリー H  
他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因や品質が変わるおそれがあります。)
- (4)ビオスリー Hi錠 (ビン入り品)  
本剤は湿気を吸いやすいので、服用のつど必ずフタをかたくしめてください。
- (5)ビオスリー Hi錠 (ビン入り品)  
ビンの中の上部のつめものは、錠剤がこわれるのを防ぐために入れてありますので、フタを開けた後は取り除いてください。
- (6)ビオスリー Hi錠 (ビン入り品)、ビオスリー H
- (4)ビオスリー Hi錠 (PTP品)  
使用期限のすぎた製品は服用しないでください。

共通事項解説〔3〕参照

1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は、他に原因があることも考えられます。症状がよくならないまま服用を続けると悪化することも考えられるため、医師又は薬剤師に相談していただくための注意です。

共通事項解説〔6〕参照

共通事項解説〔7〕参照

共通事項解説〔8〕参照

共通事項解説〔9〕参照

共通事項解説〔10〕参照

共通事項解説〔11〕参照

共通事項解説〔13〕参照

共通事項解説〔12〕参照

共通事項解説〔14〕参照

(次頁につづく)

【使用上の注意】

【解 説】

共通事項解説はこちら

- (7)ビオスリー Hi錠 (ビン入り品)  
箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (5)ビオスリー Hi錠 (PTP品)  
箱の「開封年月日」記入欄に、内袋 (アルミの袋) を開封した日付を記入してください。
- (8)ビオスリー Hi錠 (ビン入り品)  
一度開封した後は、品質保持の点からすみやかに服用してください。
- (6)ビオスリー Hi錠 (PTP品)  
一度内袋 (アルミの袋) を開封した後は、品質保持の点からすみやかに服用してください。
- (5)ビオスリー H  
分包の1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

共通事項解説 [15] 参照

共通事項解説 [16] 参照

1包を分割した場合には、残った薬の品質保持の点から、袋の口を折り返したりして、便宜的に保管することがありますが、これも長期間おきますと湿気などで薬の変質などの原因になります。もし服用する場合には2日以内に服用してください。