

新カルシチュウD₃ 新カルシチュウD₃グリーンT

【使用上の注意】

【解 説】

共通事項解説はこちら

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
医師の治療を受けている人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、腹部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓し（箱に入れ）て保管して下さい。キャップの閉め方が不十分な場合、湿気等の影響で薬が変質することがありますので、使用のつどキャップをきちんと閉めて下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）

(4)ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をボトルに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。

(5)ボトルの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。

(6)ボトルの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違えて服用しないよう注意して下さい。

共通事項解説〔3〕参照

本剤の服用により、人によってはこれらの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合には服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

この症状は、服用を一時中止すれば消失するものですが、症状の持続または増強が見られた場合には、他に原因があることも考えられるので、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

カルシウム主薬製剤の服用目的は、継続的な補給によりカルシウム不足を補うことにあります。効果のあらわれ方は服用する人の症状や状態により異なるので、長期連用（3カ月以上）する場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

共通事項解説〔7〕参照

共通事項解説〔6〕参照

共通事項解説〔9〕参照
共通事項解説〔13〕参照

共通事項解説〔10〕参照

共通事項解説〔11〕参照

ぬれた手で錠剤を取り扱おうと錠剤の表面が溶けて変色、色むらや斑点を生じることがあります。また、このような錠剤を容器に戻すと、錠剤に付いた水分により品質が変わるおそれがあります。

共通事項解説〔12〕参照

薬剤の品質保持のため、乾燥剤は容器に入れたままにして下さい。また、誤って服用しないよう注意して下さい。

(次頁につづく)

【使用上の注意】

【解 説】

[共通事項解説はこちら](#)

(7)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

共通事項解説〔14〕参照

(8)箱とボトルの「開封年月日」記入欄に、ボトルを開封した日付を記入して下さい。

共通事項解説〔15〕参照

(9)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用して下さい。

共通事項解説〔16〕参照