

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ドキシジン錠
2	成分・分量	6錠(15歳以上の1日服用量)中 メトカルバモール 1,500mg、エテンザミド 900mg、無水カフェイン 90mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル) 90mg、ジベンゾイルチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体) 24mg
3	用法・用量	15歳以上1回2錠、12歳～14歳1回1錠を1日3回、なるべく空腹時をさけて、水またはお湯で服用
4	効能・効果	●筋肉の異常緊張・けいれん・疼痛をとまなう次の諸症 腰痛、肩こり、筋肉痛、四十腰、五十肩、神経痛、寝ちがい、ねんざ、打撲、スポーツ後の筋肉痛、関節痛
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤または解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないで下さい 4. 服用前後は飲酒しないで下さい 5. 長期連用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい ・医師または歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっているまたはその疑いのある小児(12歳～14歳) ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2014.6】