

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	フェリア
2	成分・分量	3包(3g、1日最大服用量)中 イブプロフェン 450mg
3	用法・用量	15歳以上1回1包、1日3回を限度とする。服用間隔は4時間以上あけ、なるべく空腹時をさけて、水またはお湯で服用
4	効能・効果	・生理痛・腰痛・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ・悪寒・発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児 (4) 出産予定日12週以内の妊婦 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないで下さい 4. 服用前後は飲酒しないで下さい 5. 長期連用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい ・医師または歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・授乳中の人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病 ・次の病気にかかったことのある人 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2014.6】