

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ハイシーL
2	成分・分量	3錠(1日最大服用量)中 ビタミンCとして 2,000mg 〔アスコルビン酸(ビタミンC) 1,000mg、L-アスコルビン酸ナトリウム 1,124.79mg〕、 リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル) 12mg
3	用法・用量	15歳以上 1回1錠、1日1~3回、食後に、口の中でとかすか、またはかみくだいて服用
4	効能・効果	1. 次の諸症状の緩和 しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 2. 次の場合の出血予防 歯ぐきからの出血、鼻出血 3. 次の場合のビタミンCの補給 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期 「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談すること。」
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2014. 6】