


チュアブルタイプのビタミンC製剤

ハイシー[®]L

第3類医薬品



重さ：2.00g
直径：20.0mm
厚さ：4.7mm

黄色のチュアブル錠（素錠）

専用容器（携帯ケース）

特徴

- ビタミンCが、しみ・そばかす、日焼けなどによる色素沈着を緩和します。
- 皮膚に関連するビタミンB₂も配合しています。
- ビタミンC 2,000mg（1日最大服用量）が3錠で補給できます。
- 服用しやすいほのかな甘味と酸味をもち、口の中できずかすか、かみくだいて服用する黄色のチュアブル錠です。
- 専用容器（専用「携帯ケース」）に入れかえてご使用ください。

効能

- 1. 次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 2. 次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血
- 3. 次の場合のビタミンCの補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談すること。」

用法用量

次の量を、食後に、口の中できずかすか、またはかみくだいて服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1錠	1～3回
15歳未満	服用しないこと	

必ず専用容器に入れ替えて使用すること。

品質保証期間

3年6ヵ月

☆一度内袋（アルミの袋）を開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。

☆専用容器に入れた場合には、1ヵ月以内に服用すること。本剤はとくに吸湿しやすい製剤なので服用のつど専用容器のフタをしっかりとしめること。

成分

3錠（1日最大服用量）中

成分	含量
ビタミンCとして	2,000mg
〔アスコルビン酸（ビタミンC） L-アスコルビン酸ナトリウム〕	1,000mg 1,124.79mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	12mg

添加物：トモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、白糖

☆本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものなので心配ありません。


この医薬品は、「使用上の注意」をよく読んで正しくご使用いただきますよう、ご説明ください。
「使用上の注意」は健康サイト(<https://alinamin-kenko.jp>)からご覧いただけます。

お肌とビタミンCの関係


1 メラニン

～ビタミンCをじゅうぶんにとって しみ・そばかすをうすくしましょう～

紫外線を浴びますと肌の色が黒くなりますが、これは体内のチロシンというアミノ酸から黒色メラニンができるためです。ビタミンCは、できた黒色メラニンを無色の還元メラニンにしますので、日焼けによるしみ・そばかすをうすくします。




太陽光線とメラニン



2 コラーゲンの生合成

～ビタミンCをじゅうぶんにとって しっかりとした組織をつくりましょう～

コラーゲンはからだの中の総タンパク質の約1/3を占めており、皮膚、骨、腱などの主要部分をつくり、細胞と細胞をしっかり結びつける働きをしています。このコラーゲンがつけられる時、ビタミンCを必要としています。もし、ビタミンCが不足すると、コラーゲンがしっかりつけられず、結合組織、皮膚、血管が弱くなり、末梢血管から血液が漏れてきてしまいます。



販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	ハイシーL		
包装	40錠 (専用容器付き)	60錠 (つめ替え用、専用容器なし)	100錠 (つめ替え用、専用容器なし)
メーカー希望小売価格	1,815円 (税抜価格1,650円)	2,178円 (税抜価格1,980円)	3,520円 (税抜価格3,200円)
バーコード			