



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

ハイシー[®]1000

ビタミンC製剤

特徴

第3類医薬品

- ビタミンC 2,000mgを2包(1日最大服用量)で補給できます。
- ビタミンCがメラニンの生成を抑え黒色メラニンの無色化を促進することで、しみ・そばかすをやわらげます。皮膚に関連するビタミンB₂も配合しています。
- ビタミンCが肌や血管の維持にかかせないコラーゲンの生成を助け、鼻や歯ぐきからの出血を予防します。
- 疲れたときやカゼをひいたときなどのビタミンC補給に効果的です。
- サツと溶ける、甘ずっぱい黄色の細粒です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
次の診断を受けた人。
フェニルケトン尿症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能

1. 次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
2. 次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血
3. 次の場合のビタミンCの補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談すること。」

用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	1～2回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>
用法・用量を厳守すること。



成分 2包(4g、1日最大服用量)中

成分	含量
ビタミンCとして	2,000mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC) L-アスコルビン酸ナトリウム	1,000mg 1,124.79mg〕
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	12mg


添加物：トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、白糖

<成分に関連する注意>

- (1)尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせること(尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがある)。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものなので心配ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



マメ知識

ビタミンCについて

- 皮膚のメラニンに働いて、しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。
- 細胞と細胞をつなぎ、肌のしなやかさを保つのに役立つコラーゲンの生成に必要で、血管壁を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

アリナミン製薬株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

なお、健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

健康サイト

検索

<https://alinamin-kenko.jp>



製造販売元 **アリナミン製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号