

# 레소어 72<sup>®</sup>

## LESOERU72의 특징

피임에 실패했을 때나 피임을 하지 않고 성교 후 긴급하게 피임을 할 때 사용하는 약입니다.

- 복용하고 3주 후에 임신 검사약을 사용하거나 의료기관을 방문하여 임신 여부를 확인하십시오. 임신 검사약의 확인 결과가 양성인 경우에는 가능한 한 빨리 의료기관을 방문하여 의사의 진찰을 받으십시오.
- 이 약은 임신을 완전히 방지할 수 있는 것은 아닙니다.
- 성교 전에 이 약을 복용해도 임신을 방지할 수 없습니다.
- 복용 전에 연수를 수료한 약사로부터 이 약 복용 전 확인, 복용 후 주의사항에 대해 설명을 들으십시오. 성교 후 72 시간 이내에 1정을 연수를 수료한 약사로부터 받아 그 자리에서 복용하십시오.

## ⚠ 사용상의 주의사항

### ☒ 금지사항

(지키지 않으면 부작용이 발생하기 쉽습니다)

1. 다음 사람은 복용하지 마십시오.
  - (1) 이 약 또는 이 약의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
  - (2) 다음 진단을 받은 사람 : 간질환
  - (3) 임신 중인 사람
  - (4) 남성
2. 수유 중인 경우에는 이 약을 복용하지 마십시오. 또는 이 약을 복용한 후에는 적어도 24시간 동안 수유를 하지 마십시오.

### 🗨 상담할 내용

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 약사와 상담해 주십시오.
  - (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
  - (2) 약으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
  - (3) 다음 진단을 받은 사람 : 심장병, 신장병, 음식이나 약의 흡수를 방해하는 중증의 소화기 질환
  - (4) 서양고추나물 (세인트 존스 워트) 을 포함한 식품을 섭취하고 있는 사람
2. 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상담해 주십시오.

관계 부위	증상
소화기	메스꺼움·구토, 하복부 통증, 설사, 복통
정신신경계	두통, 졸음, 어지러움, 불안
생식기	부정성기출혈, 월경이상 (월경과다, 월경지연)
기타	빈혈, 권태감·피로, 어지러움, 입마름, 열감, 손발 부종, 유방 압통 (유방을 누르거나 만질 때 느껴지는 통증)

3. 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 임신 등의 가능성이 있으므로, 이 설명서를 가지고 신속하게 의사 또는 약사와 상담해 주십시오.
  - (1) 월경 (생리) 이 예정된 시기 (이 약을 복용하기 전 가장 최근에 시작된 월경 (생리) 이 시작된 날로부터 약 1개월 후 (28일 주기의 경우) ) 로부터 7일 이상 지나도 하지 않는 경우
  - (2) 월경 (생리) 과 같은 출혈이나 두통, 메스꺼움, 권태감, 졸음 등 월경 (생리) 시 또는 임신 초기에 나타나는 증상이 7일 이상 지속되는 경우
  - (3) 월경 (생리) 이 예정된 시기 (이 약을 복용하기 직전 가장 최근 월경 (생리) 이 시작된 날로부터 약 1개월 후 (28일 주기의 경우) ) 보다 빨리 하거나 출혈량이 평소와 다른 경우

(뒷면에 계속)

(앞면에서 계속)

### 기타 주의사항

- (1) 이 약의 복용 전에 이미 임신이 성립된 경우에는 이 약은 효과가 없습니다. 임신 중인 여성은 복용하지 마십시오.
- (2) 이 약은 성교 후에 긴급하게 임신을 방지하기 위한 것입니다. 이 약을 복용한 후에도 임신할 가능성이 있으므로, 계획적으로 피임하는 경우에는 저용량 경구 피임약을 계속 사용하는 등 피임 효과가 높은 방법으로 피임하십시오.
- (3) 이 약이 효과가 있었는지는 복용 후 즉시 알 수 있는 것이 아닙니다. 복용 3주 후에 임신 검사약의 사용 또는 의료기관 방문을 통해 임신 여부를 확인하십시오. 임신 검사약의 확인 결과가 양성인 경우에는 가능한 한 빨리 의료기관을 방문하여 의사의 진찰을 받으십시오.

### 효능·효과

#### 긴급 피임

##### <효능·효과 관련 주의사항>

- (1) 이 약은 임신을 완전히 방지할 수 있는 것은 아닙니다.
- (2) 이 약은 피임에 실패했을 때나 피임을 하지 않고 성교를 한 후 긴급하게 사용하는 것으로, 성교 전에 이 약을 복용해도 임신을 방지할 수 없습니다.
- (3) 이 약 복용 후에도 임신할 가능성이 있으므로 적절한 피임을 하십시오.

### 용법·용량

성교 후 72시간 이내에 이 약 1정을 약사로부터 받아 그 자리에서 복용한다.

##### <용법·용량 관련 주의사항>

- (1) 용법·용량을 엄수하십시오.
- (2) 가능한 한 신속하게 복용하십시오.
- (3) 복용 전에 약사로부터 이 약 복용 전 확인, 복용 후 주의사항에 대해 설명을 받으십시오.
- (4) 알약 꺼내는 방법

오른쪽 그림과 같이 알약이 들어있는 PTP 시트의 불록한 부분을 손가락으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 박지를 찢어서 꺼낸 후 복용하십시오. (잘못하여 그대로 삼키면 식도 점막을 찢는 등 뜻밖의 사고로 이어질 수 있습니다)



### 성분·함량 (1정 중)

이 약은 흰색 알약입니다.

유효성분	배합량
Levonorgestrel	1.50mg

첨가물 : Corn starch, povidone, sodium starch glycolate, anhydrous silicic acid, magnesium stearate, lactose hydrate

### 보관 및 취급상의 주의사항

- (1) 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오. 사용기한은 겉박스에 기재되어 있습니다.
- (2) 겉박스와 설명서를 잘 보관하십시오.

### 문의처

이 제품에 대한 문의는 구입하신 매장 또는 아래로 부탁드립니다.

**Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd.** <고객상담실>

수신자 부담 전화 0120-567-087

접수 시간 : 9:00~17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

Marketing Authorization Holder

 **Fuji Pharma Co., Ltd.**

1515 Tsujigado, Mizuhashi, Toyama-shi,  
Toyama, Japan

Distributed by

**Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd.**

〒541-0045 1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan