

Certifique-se de que lê atentamente as instruções antes da utilização. Guarde este folheto de instruções num local seguro para consulta posterior.

Contraceutivo de emergência

Medicamento com orientação

Nome comercial: LESOERU 72

レソエル® 72

Principais características do LESOERU 72

Este medicamento é utilizado como contraceutivo de emergência quando a contraceção tiver falhado ou após relações sexuais sem contraceutivo.

- Confirme se está grávida através de um teste de gravidez ou consultando um médico 3 semanas após tomar este medicamento. Se o resultado do teste de gravidez for positivo, consulte um médico o mais brevemente possível.
- Este medicamento não é 100% eficaz na prevenção de uma gravidez.
- Tomar este medicamento antes das relações sexuais não previne uma gravidez.
- Antes de tomar este medicamento, obtenha uma explicação de um farmacêutico que tenha concluído a formação necessária relativamente aos controlos a fazer antes de tomar o medicamento e as precauções a seguir após tomá-lo. No prazo de 72 horas após as relações sexuais, obtenha 1 comprimido deste medicamento de um farmacêutico que tenha concluído a formação necessária e tome-o no momento.



PRECAUÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO

A evitar

(O incumprimento destas instruções pode aumentar a probabilidade de efeitos secundários.)

1. Este medicamento não deve ser tomado pelas seguintes pessoas:
 - (1) Pessoas que tiveram sintomas de alergias devido a este medicamento ou qualquer um dos seus ingredientes.
 - (2) Pessoas que tenham sido diagnosticadas com a seguinte condição: doença hepática.
 - (3) Mulheres grávidas
 - (4) Homens
2. As mulheres em período de amamentação não devem tomar este medicamento ou devem evitar amamentar durante, no mínimo, 24 horas após tomar este medicamento.

Consulte um farmacêutico ou médico para o seguinte

1. Consulte um farmacêutico antes de tomar este medicamento se se identificar com um dos pontos abaixo:
 - (1) Pessoas a receber tratamento médico
 - (2) Pessoas que tiveram sintomas de alergias devido a medicamentos, etc.
 - (3) Pessoas que foram diagnosticadas com as seguintes condições: doença cardíaca, doença renal ou fortes perturbações gastrointestinais que interferem com a absorção de alimentos ou medicamentos
 - (4) Pessoas a consumir alimentos com Erva de São João (*Hypericum perforatum*)
2. Os seguintes sintomas podem ser efeitos secundários deste medicamento. Se ocorrer algum destes sintomas, consulte um médico ou farmacêutico e leve este folheto de instruções consigo.

Área afetada	Sintomas
Órgãos gastrointestinais	Náuseas/vômitos, dor no abdominal inferior, diarreia, dor abdominal
Sistema psiconeurológico	Dores de cabeça, sonolência, tonturas, ansiedade
Órgãos reprodutores	Sangramento vaginal anormal, perturbações menstruais (menorragia, atrasos na menstruação)
Outro	Anemia, mal-estar/fadiga, atordoamento, boca seca, sensação de calor, inchaço das mãos e pés, mastalgia (dor que pode ser sentida à pressão ou ao toque na mama)

3. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer após tomar este medicamento, existe a possibilidade de gravidez ou condição relacionada. Consulte imediatamente um médico ou farmacêutico e leve este folheto de instruções consigo.
 - (1) Se a menstruação (período) não ocorrer durante 7 dias ou mais após o tempo previsto [aproximadamente 1 mês após a data de início da menstruação (período) mais recente antes de tomar este medicamento (no caso de um ciclo de 28 dias)].
 - (2) Se um sangramento semelhante à menstruação (período) ou sintomas observados durante a menstruação (período) ou início de gravidez, como dores de cabeça, náuseas, mal-estar ou sonolência, continuarem durante 7 dias ou mais.
 - (3) Se a menstruação (período) ocorrer mais cedo do que o previsto [aproximadamente 1 mês após a data de início da menstruação (período) mais recente antes de tomar este medicamento (no caso de um ciclo de 28 dias)] ou se a quantidade de sangramento for involgar.

(Continuação no verso)

(Continuação na frente)

OUTRAS PRECAUÇÕES

- (1) Se a gravidez já tiver sido estabelecida antes de tomar este medicamento, este medicamento não será eficaz. As mulheres grávidas não devem tomar este medicamento.
- (2) Este medicamento destina-se a ser utilizado após relações sexuais para a prevenção de emergência de uma gravidez. Mesmo assim, a gravidez pode ocorrer após tomar este medicamento; por isso, se estiver a planear uma contraceção, utilize um método contraceptivo altamente eficaz, tal como a toma contínua de contraceptivos orais de baixa dosagem.
- (3) Não é possível determinar se este medicamento foi eficaz imediatamente após o tomar. Confirme se está grávida através de um teste de gravidez ou consultando um médico 3 semanas após tomar este medicamento. Se o resultado do teste de gravidez for positivo, consulte um médico o mais brevemente possível.

INDICAÇÕES

Contraceção de emergência

<PRECAUÇÕES RELATIVAS ÀS INDICAÇÕES>

- (1) Este medicamento não é 100% eficaz para prevenir uma gravidez.
- (2) Este medicamento é utilizado como contraceptivo de emergência quando a contraceção tiver falhado ou após relações sexuais sem contraceptivo e tomar este medicamento antes das relações sexuais não irá prevenir uma gravidez.
- (3) Pode ocorrer uma gravidez mesmo após tomar este medicamento; por isso, utilize a contraceção adequada.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

Obtenha 1 comprimido deste medicamento de um farmacêutico no prazo de 72 horas após as relações sexuais e tome-o no momento.

<PRECAUÇÕES RELATIVAS À DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO>

- (1) Cumpra estritamente a dosagem e administração.
- (2) Tome este medicamento o mais brevemente possível.
- (3) Antes de tomar este medicamento, obtenha uma explicação de um farmacêutico relativa aos controlos a fazer antes de tomar o medicamento e as precauções a seguir após tomá-lo.
- (4) Como remover o comprimido

Tal como mostrado na figura à direita, pressione firmemente a parte elevada da embalagem do comprimido com a ponta do dedo para quebrar a folha de alumínio na parte traseira, retire o comprimido e tome-o. (A ingestão acidental da embalagem pode resultar em acidentes inesperados, tal como uma perfuração da mucosa esofágica por uma extremidade pontiaguda.)

Empurrar para fora



INGREDIENTES E DOSAGEM (1 comprimido)

Este medicamento é um comprimido branco.

Ingrediente ativo	Dosagem
Levonorgestrel	1,50 mg

Excipientes: Amido de milho, povidona, glicolato de amido de sódio, ácido silícico anidro, estearato de magnésio, hidrato de lactose

PRECAUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- (1) Não ingira produtos fora da data de validade. A data de validade está indicada na caixa exterior.
- (2) Guarde cuidadosamente a caixa exterior e este folheto de instruções.

INFORMAÇÕES DE CONTACTO

Para consultas relativas a este produto, contacte a loja onde adquiriu ou as informações de contacto abaixo.

Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd. [Linha de apoio ao cliente]

Número verde: 0120-567-087

Horário de expediente: 9:00 às 17:00 (exceto sábados, domingos e feriados)

Marketing Authorization Holder

 **Fuji Pharma Co., Ltd.**

1515 Tsujigado, Mizuhashi, Toyama-shi,
Toyama, Japan

Distributed by

Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd.

〒541-0045 1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan