

使用前请仔细阅读本说明书。并请妥善保管，以便需要时查阅。

紧急避孕药

要指导医药品

销售名称：LESOERU72

# レソエル<sup>®</sup>72

## LESOERU72的特点

用于在避孕失败或未采取避孕措施的性行为后，进行紧急避孕时使用的药物。

- 服用3周后，请使用妊娠检测试剂或前往医疗机构就诊，以确认是否妊娠。若妊娠检测试剂检测结果为阳性，请尽早前往医疗机构就诊。
- 本品不能完全预防妊娠。
- 在性行为前服用本品不能预防妊娠。
- 服用前，请接受经培训合格的药剂师关于本品服用前确认事项及服用后注意事项的说明。在性行为后72小时内，请从经培训合格的药剂师处领取本品1片，并当场服用。

## ⚠ 使用注意事项

### ☒ 禁忌事项

(若不遵守，可能更易发生不良反应)

#### 1. 以下人群请勿服用：

- (1) 曾对本品或本品成分有过敏反应的人
- (2) 经诊断患有以下疾病的人：肝脏疾病
- (3) 孕妇
- (4) 男性

#### 2. 哺乳期妇女请勿使用本品；若已服用本品，请在服用后至少24小时内避免哺乳。

### ■ 需咨询事项

#### 1. 以下人群在服用前请咨询药剂师：

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 曾因药物等引起过敏反应的人
- (3) 经诊断患有以下疾病的人：心脏病、肾脏病、阻碍食物或药物吸收的严重消化道疾病
- (4) 正在食用含有贯叶连翘（圣约翰草）成分食品的人

#### 2. 服用后若出现下列症状，可能为不良反应，请携带本说明书咨询医生或药剂师。

相关部位	症状
消化系统	恶心、呕吐、下腹部疼痛、腹泻、腹痛
精神神经系统	头痛、嗜睡、眩晕、焦虑
生殖系统	非经期阴道出血、月经异常（月经过多、月经延迟）
其他	贫血、倦怠感、疲劳、眩晕感、口干、发热感、手脚水肿、乳房压痛（按压或触碰乳房时产生的疼痛）

#### 3. 服用后若出现下列症状，可能存在妊娠等情况，请携带本说明书，立即咨询医生或药剂师。

- (1) 月经（生理期）未在预期时间（服用本品前的最近一次月经（生理期）开始之日起约1个月后（以28天周期计算））来临，且推迟7天以上时
- (2) 出现类似月经（生理期）的出血，或头痛、恶心、倦怠感、嗜睡等月经（生理期）或妊娠初期常见的症状，且持续7天以上时
- (3) 月经（生理期）早于预期时间（服用本品前的最近一次月经（生理期）开始之日起约1个月后（以28天周期计算））来临，或出血量与往常不同时

(续见背面)

(续前页)

### 其他注意事项

- (1) 在服用本品前，若已经妊娠，则本品无效。妊娠的女性请勿服用。
- (2) 本品仅用于性行为后的紧急避孕。服用本品后仍有可能妊娠。如需进行计划性避孕，请采用持续服用短效口服避孕药等避孕效果更高的方法。
- (3) 无法在服用后立即判断本品是否生效。服用3周后，请使用妊娠检测试剂或前往医疗机构就诊，以确认是否妊娠。若妊娠检测试剂检测结果为阳性，请尽早前往医疗机构就诊。

## 功效与作用

### 紧急避孕

〈功效与作用相关注意事项〉

- (1) 本品不能完全预防妊娠。
- (2) 本品用于在避孕失败或未采取避孕措施的性行为后紧急使用。在性行为前服用本品不能预防妊娠。
- (3) 由于服用本品后仍有可能妊娠，请采取适当的避孕措施。

## 用法与用量

在性行为后72小时内，从药剂师处领取本品1片，并当场服用。

〈用法与用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法与用量。
- (2) 请尽早服用。
- (3) 服用前，请接受药剂师关于本品服用前确认事项及服用后注意事项的说明。
- (4) 片剂的取出方法

如右图所示，用指尖用力按压装有片剂的PTP铝塑包装的凸起部位，压破背面的铝箔后取出服用。（若误将包装连同片剂一起吞服，可能刺伤食道黏膜等，导致意外事故。）



## 成分与含量（每1片中）

本品为白色片剂。

有效成分	含量
Levonorgestrel	1.50mg

成分添加剂：Corn starch, povidone, sodium starch glycolate, anhydrous silicic acid, magnesium stearate, lactose hydrate

## 保管及使用上的注意事项

- (1) 请勿服用超过使用期限的产品。使用期限标示于外包装盒上。
- (2) 请妥善保管外包装盒及说明书。

## 咨询方式

如对本产品有任何疑问，请向购买门店或联系下列单位咨询。

**Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd.** “客户咨询室”

免费热线 0120-567-087

受理时间：9:00~17:00（周六、周日及法定节假日除外）