

使用前請仔細閱讀本說明書。並請妥善保存，以便需要時查閱。

緊急避孕藥

要指導醫藥品

銷售名稱：LESOERU72

# レソエル®72

## LESOERU72的特點

用於在避孕失敗或未採取避孕措施的性行為後，作為緊急避孕使用之藥品。

- 服用3週後，請使用妊娠檢測試劑或前往醫療機構就診，以確認是否妊娠。若妊娠檢測試劑結果為陽性，請儘早前往醫療機構就診。
- 本品無法完全預防妊娠。
- 於性行為前服用本品無法預防妊娠。
- 服用前，請接受經訓練合格之藥師就本品服用前確認事項及服用後注意事項之說明。請於性行為後72小時內，自經訓練合格之藥師處領取本品1錠，並當場服用。

## ⚠ 使用注意事項

### ☒ 禁忌事項

(若未遵守，可能較易發生不良反應)

#### 1. 下列人士請勿服用：

- (1) 曾對本品或本品成分產生過敏反應者
- (2) 經診斷罹患下列疾病者：肝臟疾病
- (3) 孕婦
- (4) 男性

#### 2. 哺乳期間婦女請勿使用本品；如已服用本品，服用後至少24小時內應避免哺乳。

### 🗉 需諮詢事項

#### 1. 下列人士於服用前請諮詢藥師：

- (1) 正在接受醫師治療者
- (2) 曾因藥物等引起過敏反應者
- (3) 經診斷罹患下列疾病者：心臟病、腎臟病、影響食物或藥物吸收之嚴重消化道疾病
- (4) 正在食用含有貫葉連翹（聖約翰草）成分食品者

#### 2. 服用後如出現下列症狀，可能為不良反應，請攜帶本說明書諮詢醫師或藥師。

相關部位	症狀
消化系統	噁心、嘔吐、下腹部疼痛、腹瀉、腹痛
精神神經系統	頭痛、嗜睡、眩暈、焦慮
生殖系統	非經期陰道出血、月經異常（月經量過多、月經延遲）
其他	貧血、倦怠感、疲勞、眩暈感、口乾、發熱感、手腳水腫、乳房壓痛（按壓或觸碰乳房時產生之疼痛）

#### 3. 服用後如出現下列症狀，可能存在妊娠等情況，請攜帶本說明書，立即諮詢醫師或藥師。

- (1) 月經（生理期）未於預期時間（自服用本品前最近一次月經（生理期）開始日起約1個月後（以28天週期計算））來臨，且延遲7天以上時
- (2) 出現類似月經（生理期）之出血，或頭痛、噁心、倦怠感、嗜睡等月經（生理期）或妊娠初期常見症狀，且持續7天以上時
- (3) 月經（生理期）早於預期時間（自服用本品前最近一次月經（生理期）開始日起約1個月後（以28天週期計算））來臨，或出血量與以往不同時

(續見背面)

(續前頁)

### 其他注意事項

- (1) 於服用本品前，如已妊娠，則本品無效。妊娠婦女請勿服用。
- (2) 本品僅用於性行為後之緊急避孕。服用本品後仍有可能妊娠。如需計畫性避孕，請採用持續服用低劑量口服避孕藥等避孕效果較高之方法。
- (3) 無法於服用後立即判斷本品是否生效。服用3週後，請使用妊娠檢測試劑或前往醫療機構就診，以確認是否妊娠。若妊娠檢測試劑結果為陽性，請儘早前往醫療機構就診。

## 功效與作用

### 緊急避孕

〈功效與作用相關注意事項〉

- (1) 本品無法完全預防妊娠。
- (2) 本品用於避孕失敗或未採取避孕措施之性行為後緊急使用。於性行為前服用本品無法預防妊娠。
- (3) 服用本品後仍有可能妊娠，請採取適當避孕措施。

## 用法與用量

請於性行為後72小時內，自藥師處領取本品1錠，並當場服用。

〈用法與用量相關注意事項〉

- (1) 請嚴格遵守用法與用量。
- (2) 請儘早服用。
- (3) 服用前，請接受藥師就本品服用前確認事項及服用後注意事項之說明。
- (4) 錠劑取出方法

如右圖所示，用指尖用力按壓裝有錠劑之PTP鋁箔包裝凸起部位，壓破背面鋁箔後取出服用。  
(若誤將包裝連同錠劑一併吞服，可能刺傷食道黏膜等，導致意外事故。)



## 成分與含量 (每1錠中)

本品為白色錠劑。

有效成分	含量
Levonorgestrel	1.50mg

賦形劑：Corn starch, povidone, sodium starch glycolate, anhydrous silicic acid, magnesium stearate, lactose hydrate

## 保存及使用注意事項

- (1) 請勿服用超過使用期限之產品。使用期限標示於外盒。
- (2) 請妥善保存外盒及本說明書。

## 諮詢方式

如對本產品有任何疑問，請向購買門市或聯絡下列單位諮詢。

**Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd.** 「客戶諮詢室」

免付費專線 0120-567-087

受理時間：9:00~17:00 (週六、週日及國定假日除外)