要指导医药品

睡眠改善药

Rozerem® S

合理用药购药前检查表

购药前，请与药剂师一起确认本流程图的内容，检查您是否可以服用本药。
根据药剂师的判断，有时可能会建议您前往医疗机构就诊。

①正在接受医师治疗或正在服用处方药者（若回答否，请从②开始）

【请确认以下项目】 ※如果有自己不清楚的项目，请咨询医师或药剂师。

☐ 正在接受以下疾病治疗
睡眠呼吸暂停综合征、不宁腿综合征（不安腿综合征）、周期性肢体运动障碍等睡眠障碍，伴有失眠症状的精神疾病（抑郁、躁狂、精神分裂症、神经症、痴呆等）、慢性阻塞性肺疾病、肝病
☐ 正在服用以下药物
马来酸氟伏沙明（Depromel、Luvox等）：抗抑郁药

存在符合项目或不清楚的项目 → 不可服用本药 请咨询医师或药剂师

无符合项目 ↓

☐ 正在服用其他睡眠改善药或催眠镇静药（包括处方药和市售非处方药）
☐ 正在接受医师治疗
☐ 正在使用以下药物治疗
・CYP1A2抑制剂：喹诺酮类抗菌药等
・CYP2C9抑制剂：Fluconazole等
・CYP3A4抑制剂：大环内酯类抗菌药、Ketoconazole等
・CYP诱导剂：Rifampicin等
☐ 开始服用抗帕金森病药物（Levodopa等）、降压药（Propranolol等）、类固醇药物（Prednisolone等）等药物后，出现失眠症状

存在符合项目或不清楚的项目 → 由于可能无法服用本药，请携带用药手册咨询医师或药剂师

无符合项目 ↓

请进入下述②

经咨询确认没有问题 ←

②未接受医师治疗且未服用处方药者，以及已确认①者

【请确认以下项目】

☐ 未满15岁
☐ 对本剂或本剂成分有过敏史者
☐ 怀孕或可能怀孕

有符合项目 → 不可服用本药 请咨询医师或药剂师

无符合项目 ↓

☐ 短期内再次购买 （上次购买日期是什么时候？　　年　　月　　日）
☐ 老年人
☐ 除入睡困难外，还伴有以下症状
白天严重嗜睡、睡眠浅且夜间易醒、情绪低落、悲观、难以感觉疲劳或困倦、容易兴奋、出现幻觉或幻听（幻声）、妄想、记忆力下降、无法辨别时间或地点
☐ 曾患有以下疾病
失眠、睡眠呼吸暂停综合征、不宁腿综合征（不安腿综合征）、周期性肢体运动障碍等睡眠障碍、伴随失眠的精神疾病（抑郁、躁狂、精神分裂症、神经症、痴呆等）、慢性阻塞性肺疾病

有符合项目 → 请咨询医师或药剂师

无符合项目 ↓

经咨询确认没有问题 ←

请在听取药剂师的说明后，仔细阅读说明书及面向使用者的信息提供资料中记载的内容，严格遵守规定的用法与用量（每日1次，每次1片），正确服用本药。

服药时请务必遵守以下事项

- 仅在出现暂时性入睡困难的失眠症状时服用本药。
- 请勿连续服用超过2周。※如需连续服用超过2周，请咨询医师或药剂师
- 出现以下情况时，请停止服用，并咨询医师或药剂师。
  - ・出现月经异常、月经不调、闭经、男性或非哺乳期女性泌乳、性欲减退等症状时
  - ・严格遵守规定的用法与用量（每日1次，每次1片），服用2～3次后症状仍未改善时

购买或服用本药时，如有不明之处等，请咨询药剂师。