要指導醫藥品

睡眠改善藥

Rozerem®S

正確用藥購買前確認表

購買前，請與藥劑師一起確認本流程圖的內容，確認您是否可以服用本劑。
藥劑師可能會視情況，建議您前往醫療機構就診。

①正在接受醫師治療，或者正在服用處方藥者（如無上述情形，請從②開始）

【請確認下列項目】

※如有任何無法自行判斷的項目，請諮詢醫師或藥劑師。

☐正在接受下列疾病的治療
睡眠呼吸中止症候群、不寧腿症候群（腿部躁動症）、週期性肢體運動障礙等睡眠障礙、伴隨失眠的精神疾病（憂鬱症、躁症、思覺失調症、精神官能症、失智症等）、慢性阻塞性肺病、肝臟疾病
☐正在服用下列藥品
馬來酸氟伏沙明（Depromel、Luvox等）：抗憂鬱藥

有符合的項目或無法自行判斷的項目 → 不可服用本劑 請諮詢醫師或藥劑師

無符合的項目 ↓

☐正在服用其他睡眠改善藥或安眠鎮靜藥（包含醫療用醫藥品及市售藥品）
☐正在接受醫師治療
☐正在使用下列藥劑接受治療
- CYP1A2抑制劑：喹諾酮類抗生素等
- CYP2C9抑制劑：Fluconazole等
- CYP3A4抑制劑：巨環內酯類抗生素、Ketoconazole等
- CYP誘導劑：Rifampicin等

☐開始服用抗巴金森氏症藥物（Levodopa等）、降血壓藥（Propranolol等）、類固醇藥物（Prednisolone等）後，出現失眠症狀

有符合的項目或無法自行判斷的項目 → 由於可能無法服用本劑，請攜帶用藥手冊，諮詢醫師或藥劑師

無符合的項目 ↓

請進入下列②

已諮詢並確認沒有問題 ←

②未接受醫師治療且未服用處方藥者，以及已確認①者

【請確認下列項目】

☐未滿15歲
☐對本劑或本劑成分有過敏史
☐懷孕或疑似懷孕

有符合的項目 → 不可服用本劑 請諮詢醫師或藥劑師

無符合的項目 ↓

☐短期內再次購買　（上次購買日期是什麼時候？　　年　　月　　日）
☐高齡者
☐除了難以入睡之外，另有下列症狀
白天嗜睡、睡眠淺且半夜易醒、情緒變得憂鬱、變得悲觀、不易感到疲倦或睏倦、變得容易興奮、出現幻覺或幻聽（幻聲）、妄想、記憶力減退、變得無法認知時間或地點
☐過去曾經罹患下列疾病
失眠症、睡眠呼吸中止症候群、不寧腿症候群（腿部躁動症）、週期性肢體運動障礙等睡眠障礙、伴隨失眠的精神疾病（憂鬱症、躁症、思覺失調症、精神官能症、失智症等）、慢性阻塞性肺病

有符合的項目 → 請諮詢醫師或藥劑師

無符合的項目 ↓

已諮詢並確認沒有問題 ←

請聽取藥劑師的說明，詳閱仿單及專供使用者參考之資料所載內容，嚴格遵守規定的用法與用量（每日1次，每次1錠），正確服用。

服用時，請務必遵守下列事項

- 請僅於出現難以入睡的暫時性失眠症狀時服用。
- 請勿連續服用超過2週。※必須連續服用超過2週的情況下，請諮詢醫師或藥劑師
- 下列情況下，請停止服用，諮詢醫師或藥劑師。
  - 出現月經異常、月經不順、無月經、男性或非哺乳期的女性分泌乳汁、性慾減退等情況時
  - 即使嚴格遵照規定的用法及用量（每日1次，每次1錠），服用2～3次，症狀仍未改善時

購買或服用時，如有任何疑問等，請諮詢藥劑師。