의약품을 올바로 구입하기 위한

설명 문서

요지도 의약품	사용 전에 반드시 첨부 문서를 읽으십시오

1	명칭	로제렘 S
2	성분・분량	1 정(1 일 복용량) 중 라멜테온 8 mg
3	용법・용량	15 세 이상 1 회 1 정, 1 일 1 회, 취침 전 30 분 이내에 물 또는 온수와 함께 그대로 삼켜 복용
4	효능・효과	일시적인 불면의 다음 증상의 완화: 잠들기 어려움
5	보건 위생상의 위해를 방지하기 위해 필요한 사항	1. 다음 사람은 복용하지 마십시오 (1) 본제 또는 본제의 성분으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람 (2) 15 세 미만의 어린이 (3) 임부 또는 임신했을 가능성이 있는 사람 (4) 의료 기관에서 다음 질환으로 치료를 받은 사람 수면무호흡증 등의 수면 장애, 불면을 수반하는 정신 질환(우울증, 조증, 조현병, 신경증, 치매 등), 간질환 (5) 플루복사민말레산염(데프로멜, 루복스 등)으로 치료를 받는 사람 2. 본제를 복용하는 동안에는 다음의 모든 의약품을 사용하지 마십시오 다른 수면 개선약 또는 최면 진정제, 감기약, 해열 진통제, 진해 거담제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염용 내복약, 멀미약, 알레르기용 약 등) 3. 복용 후 차량 등이나 기계를 운전 조작하지 마십시오 4. 수유 중인 사람은 본제를 복용하지 말고, 만일 본제를 복용하는 경우는 수유를 피하십시오 5. 복용 전후에는 음주하지 마십시오 6. 잠들기 어려울 때만 복용하십시오 7. 복용 기간은 2 주를 초과하지 마십시오(2 주를 초과하여 복용해야 하는 경우는 의사 또는 약사와 상담하십시오) 다음에 해당하는 사람은 미리 말씀하십시오 ・의사의 치료를 받는 사람・고령자 ・잠들기 어려운 것에 더해 다음 증상이 있는 사람 낮에 심하게 졸음이 쏟아짐, 잠이 얕게 들고 한밤중에 눈이 떠짐, 우울한 기분이 듬, 비관적이 됨, 피로나 졸음을 잘 느끼지 못함, 쉽게 흥분함, 환각・환청, 망상, 기억력 저하, 시간과 장소를 인지하지 못함 ・과거 다음 질환을 앓은 적이 있는 사람 불면증, 수면무호흡증 등의 수면 장애, 불면을 수반하는 정신 질환(우울증, 조증, 조현병, 신경증, 치매 등)
6	약사가 필요하다고 판단하는 사항	

[주의 사항]

1. 본지의 내용은 고객이 의약품을 구입 및 선택할 때 도움이 되는 필요 정보입니다.
2. 법령에 따라 요지도 의약품은 반드시, 제 1 류 의약품은 약사가 불필요하다고 판단한 경우를 제외하고 정보를 제공합니다.
3. 사용 후 몸 상태에 변화 등이 있는 경우(부작용 등)는 사용을 중지하고 즉시 구입한 점포의 약사와 상담하십시오.

【2026.5】