医药品正确购买

# 说明文件

| 要指导医药品 | 使用前请务必阅读药品说明书 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名称 | Rozerem S |
| 2 | 成分与含量 | 1 片（每日服用量）中，雷美替胺 8 mg |
| 3 | 用法与用量 | 15 岁以上 1 次 1 片，每日 1 次，于睡前 30 分钟内用水或温水整片吞服，不可咀嚼 |
| 4 | 功能与效果 | 缓解暂时性失眠的以下症状：入睡困难 |
| 5 | 为防止危害健康所需注意事项 | 1. 下列人群请勿服用<br>(1) 对本品或本品成分有过敏史者<br>(2) 未满 15 岁的儿童<br>(3) 孕妇或可能怀孕者<br>(4) 正在医疗机构接受以下疾病治疗者<br>睡眠呼吸暂停综合征等睡眠障碍、伴随失眠的精神疾病（抑郁、躁狂、精神分裂症、神经症、痴呆等）、肝病<br>(5) 正在使用马来酸氟伏沙明（Depromel、Luvox 等）治疗者<br>2. 服用本剂期间，请勿使用以下任何医药品<br>其他睡眠改善药或催眠镇静药、感冒药、解热止痛药、镇咳祛痰药，以及含有抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕动病药、抗过敏药等）<br>3. 服用后请勿驾驶交通工具或者操作器械类<br>4. 哺乳期间请勿服用本剂，或者服用本剂时请勿哺乳<br>5. 服用前后请勿饮酒<br>6. 仅限于入睡困难时服用<br>7. 请勿连续服用超过 2 周（如需连续服用超过 2 周，请咨询医生或药剂师）<br>符合下列情况者，请主动告知<br>・正在接受医师治疗者、老年人<br>・除了入睡困难外，还伴有以下症状的人群：白天严重嗜睡、睡眠浅且夜间易醒、情绪低落、悲观、难以感觉疲劳或困倦、容易兴奋、出现幻觉或幻听（幻声）、妄想、记忆力下降、无法辨别时间或地点<br>・曾患有以下疾病者：失眠、睡眠呼吸暂停综合征等睡眠障碍、伴随失眠的精神疾病（抑郁、躁狂、精神分裂症、神经症、痴呆等） |
| 6 | 药剂师认为有必要的事项 | |

〔注意事项〕

1. 本说明书所载内容，是供顾客在购买、选择医药品时参考的必要信息。
2. 根据法律规定，购买要指导医药品时，必须提供相关信息；购买第一类医药品时，除非药剂师判定无需提供，否则也必须提供相关信息。
3. 使用后如出现身体状况变化（不良反应等），请立即停止使用，并尽快咨询购买店铺的药剂师。

【2026.5】