為了正確購買醫藥品

說明文件

要指導醫藥品	使用前，請務必詳閱仿單

1	名稱	Rozerem S
2	成分與分量	每錠（每日服用量）中，Ramelteon 8 mg
3	用法與用量	15 歲以上，請於就寢前 30 分鐘內，以水或溫水服用下列用量，每日 1 次，切勿咀嚼
4	功能與效果	緩解暫時性失眠的下列症狀：難以入睡
5	為了防止健康危害的必要事項	1. 以下人員請勿使用 (1) 對本劑或本劑成分有過敏史者 (2) 未滿 15 歲的兒童 (3) 孕婦或疑似懷孕者 (4) 目前正因下列疾病，於醫療機構接受治療者 睡眠呼吸中止症候群等睡眠障礙、伴隨失眠的精神疾病（憂鬱症、躁症、思覺失調症、精神官能症、失智症等）、肝臟疾病 (5) 正以馬來酸氟伏沙明（Depromel、Luvox 等），接受治療者 2. 服用本劑期間，請勿使用以下任何醫藥品 其他睡眠改善藥或安眠鎮靜藥、感冒藥、解熱止痛藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、抗過敏藥等） 3. 服用後請勿駕駛交通工具或者操作器械類 4. 哺乳期間請勿服用本劑，或者服用本劑時請勿哺乳 5. 服用前後請勿飲酒 6. 請僅於難以入睡時服用 7. 請勿連續服用超過 2 週（必須連續服用超過 2 週的情況下，請諮詢醫師或藥劑師） 符合下列情形者，請主動告知 ・正在接受醫師治療者・高齡者 ・除了難以入睡之外，另有下列症狀者：白天嗜睡、睡眠淺且半夜易醒、情緒變得憂鬱、變得悲觀、不易感到疲倦或睏倦、變得容易興奮、出現幻覺或幻聽（幻聲）、妄想、記憶力減退、變得無法認知時間或地點 ・過去曾經罹患下列疾病者：失眠症、睡眠呼吸中止症候群等睡眠障礙、伴隨失眠的精神疾病（憂鬱症、躁症、思覺失調症、精神官能症、失智症等）
6	藥劑師認為必要的事項	

〔注意事項〕

1. 本文件所載內容係有助於消費者購買及選擇醫藥品的必要資訊。
2. 依據法令規定，購買要指導醫藥品時，藥劑師必須提供資訊；購買第一類醫藥品時，除了藥劑師認為無須提供資訊的情況之外，均應提供資訊。
3. 使用後，身體狀況出現變化等的情況下（副作用等），請停止使用，立即諮詢購買店鋪的藥劑師。

【2026.5】