

## △使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 胃腸の弱い人。

(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## <用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 用法・用量を厳守すること

## <成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により錠剤の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

## 保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。

(4) ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること（詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである）。

共通事項解説〔3〕参照

本剤中にセンキュウなどが含まれており、「胃腸の弱い人」が服用すると食欲不振等を起こすこともあるので、本剤を服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談することが必要です。

共通事項解説〔5〕参照

本剤の服用により、人によってはこれらの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合には服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は、他に原因があることも考えられます。症状がよくなるまま服用を続けると悪化することも考えられるため、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

共通事項解説〔6〕参照

共通事項解説〔7〕参照

共通事項解説〔9〕参照

共通事項解説〔10〕参照

共通事項解説〔11〕参照

共通事項解説〔12〕参照

【使用上の注意】

【解 説】

[共通事項解説はこちら](#)

(5)服用のつどビンのフタをしっかりとしめること（吸湿し品質が変わる）。

共通事項解説〔13〕参照

(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

共通事項解説〔14〕参照

(7)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。

共通事項解説〔15〕参照

(8)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。

共通事項解説〔16〕参照