

ストレージタイプH

【使用上の注意】

【解説】

共通事項解説はこちら

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.1 カ月位（つわりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること。

(2) 用法・用量を厳守すること。

<成分に関する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により顆粒の色調が多少異なることがあります、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に箱に入れて保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

(4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

共通事項解説〔3〕参照

共通事項解説〔5〕参照

本剤の服用により、人によってはこれらの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合には服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

1カ月位（つわりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は、他に原因があることも考えられます。症状がよくならないまま服用を続けると悪化することも考えられるため、医師、薬剤師または登録販売者に相談していただくための注意です。

共通事項解説〔6〕参照

共通事項解説〔7〕参照

共通事項解説〔9〕参照

共通事項解説〔10〕参照

共通事項解説〔14〕参照

1包を分割した場合には、残った医薬品の品質保持の点から、袋の口を折り返したりして、便利的に保管することができますが、これも長期間おきますと湿気などで医薬品の変質などの原因になります。もし服用する場合には2日以内に服用してください。